

**电子科技大学**  
**2015 年攻读硕士学位研究生入学考试试题**  
**考试科目：693 医学综合**

内科部分

一、A 型题：1-40 小题，每题 1.5 分；41-50 题，每小题 2 分；共 80 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的答案。

1. 人体内铁的主要吸收部位在  
A. 十二指肠及空肠上段      B. 回肠      C. 结肠      D. 直肠
2. 人血浆中主要运输内源性甘油三酯的脂蛋白是  
A. CM      B. VLDL      C. LDL      D. HDL
3. 分光光度法测定蛋白质含量依据的原理是  
A. 蛋白质分子大小不同      B. 蛋白质是两性电解质      C. 蛋白质紫外吸收性质      D. 蛋白质溶液的亲水胶体性质
4. 胆碱能 M 受体活化产生的效应是  
A. 心脏活动兴奋      B. 支气管平滑肌收缩      C. 胃肠平滑肌舒张      D. 膀胱逼尿肌舒张
5. 30 岁男性患者，检查发现其血钠升高，血钾下降，全身血容量增加，血压升高，此时最可能的原因是  
A. 糖皮质激素增加      B. 交感-肾上腺髓质活动加强      C. 激肽系统活动加强      D. 醛固酮增多
6. 肺炎球菌肺炎，炎症消散后，肺部常见的是  
A. 肺部遗留纤维化      B. 肺泡受损产生局部肺气肿或肺大泡      C. 肺组织完全恢复正常      D. 造成胸膜粘连增厚
7. 对于放射治疗及化疗最敏感的肺癌类型是  
A. 鳞状上皮细胞癌      B. 未分化细胞癌      C. 腺癌      D. 细支气管肺泡癌

8. 以下不宜应用  $\beta$  阻滞剂的疾病是
- A. 二尖瓣脱垂    B. 肥厚型心肌病    C. 急性心肌梗死    D. 变异型心绞痛
9. 消化性溃疡病最常见的并发症是
- A. 幽门梗阻    B. 出血    C. 癌变    D. 穿孔
10. 结节性多动脉炎与系统性红斑狼疮，下列哪一项最具有鉴别诊断价值的是
- A. 关节痛    B. 肾脏损害    C. 白细胞计数增加，嗜酸性粒细胞增加，血小板增加    D. ANA 阳性
11. 肝性脑病患者血氨增高，导致中枢神经系统功能紊乱最主要的机制是
- A. 干扰大脑的蛋白质代谢    B. 干扰大脑的脂肪代谢    C. 干扰大脑的水盐代谢    D. 干扰大脑的能量代谢
12. 一哮喘患者，表现为焦虑、烦躁、呼吸频率加快，能正确回答问题，但只能说单字，双肺可闻及满布哮鸣音，其可能诊断为
- A. 哮喘急性发作(轻度)    B. 哮喘急性发作(中度)    C. 哮喘急性发作(重度)    D. 哮喘急性发作(危重)
13. 老年人，出现呼吸节律不规则，伴有昏迷及双侧病理征，常见于
- A. 脑干出血    B. 蛛网膜下隙出血    C. 头外伤    D. 脑炎
14. 以下哪个发生消化道出血时不应输血小板
- A. 特发性血小板减少性紫癜    B. 过敏性紫癜    C. 血小板无力症    D. 再生障碍性贫血
15. 小剂量地塞米松抑制试验用于鉴别
- A. Cushing 病与 Cushing 综合征    B. Cushing 病与异位 ACTH 综合征    C. 单纯性肥胖与 Cushing 综合征    D. 肾上腺皮质肿瘤与 Cushing 综合征
16. 发生原位溶血时，红细胞破坏的部位最主要是在
- A. 肝脏    B. 脾脏    C. 血管内    D. 骨髓
17. 慢性肺源性心脏病肺动脉高压形成的最重要因素是
- A. 缺氧    B. 呼吸性酸中毒    C. 肺血管痉挛    D. 高碳酸血症
18. 巨细胞病毒性肺炎的病理类型通常是
- A. 大叶性肺炎    B. 小叶性肺炎    C. 间质性肺炎    D. 伴肉芽肿形成的肺炎
19. 胃溃疡发生上腹痛的特点，下列哪项最符合

A. 劳累、天气骤变诱发    B. 性质多样，可胀痛也可灼痛    C. 呈进食-疼痛-缓解的过程    D. 与刺激性饮食有关

20. 艾滋病主要传播途径

A. 性接触传染    B. 注射    C. 母婴传播    D. 血液及血制品

21. 患者平卧位时，如果叩诊移动性浊音阳性，游离腹水量至少已达

A. 500ml    B. 1500ml    C. 2000ml    D. 1000ml

22. 预防丙型病毒性肝炎的最主要措施是

A. 易感人群注射丙种球蛋白    B. 加强血制品管理    C. 阻断母婴传播    D. 加强粪便、水源管理

23. 慢性肾功能衰竭患者发生慢性肾脏病-矿物质骨异常(即肾性骨营养不良或肾性骨病)的最主要原因是

A. 尿钙排泄增多    B. 长期代谢性酸中毒    C. 肾小球滤过率下降导致高磷血症    D. 维生素 D 缺乏

24. 患者男性，50 岁，头晕，夜尿增多，入院后非同日两次坐位测量血压上肢血压为 155/90 mmHg，下肢为 170/100 mmHg，父母均患高血压病。按 WHO 标准最可能诊断为

A. 白大衣性高血压    B. 临界性高血压    C. 血压正常    D. 原发性高血压

25. 角膜反射和瞳孔对光反射减弱的意识障碍是

A. 意识模糊    B. 浅昏迷    C. 中度昏迷    D. 深昏迷

26. 30 岁男性，反复阵发性心悸 3 年。每次均突然发作，持续时间 10 余分钟到 1 小时。发作时心电图：QRS 波形态正常，频率为 200 次/分，P 波不明显，诊断考虑为

A. 窦性心动过速    B. 室性心动过速    C. 心房扑动    D. 阵发性室上性心动过速

27. 呼吸衰竭的诊断中，最有意义的指标是

A. 血气分析    B. 发绀    C. 神志变化    D. 呼吸困难

28. 男性，60 岁，夜间胸骨后剧痛半小时，为压榨性，并向左臂放射。先后含硝酸甘油 3 次，疼痛稍减轻，烦躁不安，出汗。查体：急性痛苦面容，体温 36.5℃，血压为 100/70mmHg，脉率 110 次/分；心界大小，律齐，心音低，未闻奔马律

及杂音；双肺少许湿性啰音；肝脾未触及。最可能的诊断是

A. 变异型心绞痛    B. 肥厚型心肌病    C. 急性心肌梗死    D. 肺动脉栓塞

29. 鸟嘌呤核苷酸（GMP）的分解代谢产物是

A. 尿酸    B.  $\beta$ -丙氨酸    C.  $\beta$ -氨基异丁酸    D. 胺

30. 慢性胰腺炎胰液缺乏时，可引起

A. 血糖降低    B. 空腹血浆胰岛素水平升高    C. 脂肪泻    D. 恶性贫血

31. 下列哪一项不是确认肺血栓栓塞症的检查手段

A. CT 肺动脉造影    B. 超声心动图    C. 放射性核素肺通气/血流灌注扫描  
D. MRI 肺动脉造影

32. 难治性高血压的可能原因不包括

A. 使用麻黄素滴鼻液    B. 睡眠呼吸暂停低通气综合征    C. 血管内一氧化氮产生过多  
D. 使用环孢素 A

33. 肝硬化失代偿期，检验结果不常见的是

A. 凝血酶原时间延长    B. 血清总蛋白增高    C. 血清胆红素浓度增高    D. 球蛋白降低

34. 如检查发现距肛门 4.5cm 的直肠左后壁有一 2cm×3cm 大小、质硬的结节性肿块，且基底固定，指套染有血性黏液。最可能的诊断是

A. 内痔    B. 直肠息肉    C. 直肠癌    D. 肛乳头状纤维瘤

35. 原发性肝癌淋巴转移好发部位是

A. 肝门淋巴结    B. 主动脉旁淋巴结    C. 脾    D. 锁骨上淋巴结

36. 支气管哮喘应用拟肾上腺素类药物的主要作用是

A. 兴奋  $\alpha$  受体    B. 兴奋  $\beta$  受体    C. 兴奋  $\beta_1$ 、 $\beta_2$  受体    D. 兴奋  $\beta_2$  受体

37. 血清 AFP 阳性不会出现的一种情况是

A. 急性黄疸性肝炎    B. 原发性肝癌    C. 原发性胆汁性肝硬化    D. 睾丸癌

38. 下列有关淋巴瘤的说法，错误的一项是

A. 原发部位可在淋巴结外    B. 单独在骨髓中找到里-斯细胞即可诊断为 HD  
C. 可转变为白血病    D. 可出现血清球蛋白升高

39. 帕金森病最特征的表现是  
A. 肌强直 B. 静止性震颤 C. 运动迟缓 D. 姿势及步态异常
40. 下列有关抗可提取核抗原抗体的临床意义中，错误的是  
A. 抗 Sm 抗体是 SLE 特异性抗体，并与病情活动性相关 B. 抗 SSA、抗 SSB 抗体在干燥综合征中有较高阳性率 C. 抗 Jo 抗体出现在多发性肌炎、皮肌炎及合成酶综合征 D. 高滴度 U1RNP 抗体阳性常出现于混合结缔组织病
41. 72 岁男性，腹泻 3 天，神志不清 1 天，伴尿量增多。体温 37.5℃，血压 90/60mmHg，皮肤黏膜干燥。尿糖(++++)，尿酮体(±)。最可能的诊断为  
A. 感染中毒性脑病 B. 脑血管意外 C. 糖尿病酮症酸中毒 D. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
42. 60 岁女性，突发上腹痛、发热 2 天，伴巩膜黄染，最可能的诊断是  
A. 急性胆囊炎 B. 急性肠梗阻 C. 急性胰腺炎 D. 急性胃炎
43. 一例全身性水肿伴胸腹腔积液患者，下列哪项诊断不予考虑  
A. 晚期肝硬化 B. 肺心病心衰 C. 血栓性静脉炎 D. 肾病综合征
44. 关于肺结核，下列叙述不正确的是  
A. 诱发皮肤变态反应的主要成分是菌体蛋白质 B. 原发病灶和肿大的气管支气管淋巴结称为原发综合征 C. 继发性肺结核中，内源性复发是主要的发病方式 D. 人肺结核的致病菌中，牛型和非洲型分枝杆菌的比例不到 10%
45. 38 岁女性，近 2 年来体重进行性增加，向心性肥胖，血皮质醇增高，垂体磁共振显像有微腺瘤，以下哪项治疗方法为首选方法  
A. 肾上腺切除 B. 经蝶窦切除微腺瘤 C. 垂体放射治疗 D. 肾上腺皮质激素合成阻滞药物治疗
46. 20 岁女性患者，晨起时发现神志不清，呼之不应，唇呈樱桃红色，呼吸浅慢，脉搏细数，测 COHb 浓度>50%，最可能的诊断是  
A. 有机磷农药中毒 B. 阿托品中毒 C. 氰化物中毒 D. 一氧化碳中毒
47. 60 岁男性，有冠心病及高血压病史，夜间睡眠中突然呼吸困难，不能平卧，大汗，急诊心电图示下壁心肌梗死。查体：血压 160/90mmHg，双肺水泡音，心率 90 次/分，可闻及室性奔马律。最可能的诊断是  
A. 低血容量性休克 B. 心源性休克 C. 急性左心衰竭 D. 心律失常

48. 下列对慢性淋巴细胞性甲状腺炎有诊断意义的是
- A. TGA<sub>b</sub> 与 TPOA<sub>b</sub> 常明显 ↑      B. 实验室检查呈所谓"分离现象"      C. 一过性甲状腺毒症      D. 甲状腺扫描摄碘功能 ↓
49. 女性, 38 岁, 间断发作下腹部疼痛伴腹泻 3 年, 排便 4~5 次/天, 脓血便, 排便后疼痛可缓解。曾行结肠镜检查见充血、糜烂及浅表小溃疡, 此患者最可能的诊断是
- A. 细菌性痢疾      B. 溃疡性结肠炎      C. 肠易激综合征      D. 结肠癌
50. 患者男性, 30 岁, 持续性心前区钝痛 1 天, 向左肩放射, 深呼吸加重, 伴发热, 气短, 心电图示除 AVR 外, 各导联 ST 段呈弓背向下型抬高, T 波高尖, 最可能的诊断为
- A. 急性心包炎      B. 风湿性心包炎      C. 扩张型心肌病      D. 肥厚型梗阻性心肌病

二、X 型题: 51-65 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案, 多选或少选均不得分。

51. 渗出液的特点是 ABD
- A. 相对密度  $\geq 1.018$       B. 蛋白质定量  $>30\text{g/L}$       C. 粘蛋白试验(Rivalta 试验) 阴性      D. 细胞数  $>200$  个/ $\mu\text{L}$
52. 急进性肾炎与急性肾炎的鉴别是前者具有 BD
- A. 大量蛋白尿      B. 持续性少尿或无尿      C. 高血压      D. 迅速发生并加重的肾功能损害
53. 下述哪些细胞参与慢性支气管炎发病过程 ABCD
- A. 上皮细胞      B. 淋巴细胞      C. 浆细胞      D. 杯状细胞
54. 抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA) 的靶抗原包括 ABD
- A. 丝氨酸蛋白酶 3      B. 髓过氧化物酶      C. 白三烯      D. 乳铁蛋白
55. 下列属于抑菌剂的抗菌药有 ABC
- A. 磺胺类      B. 大环内酯类      C. 氯霉素类      D. 氨基糖苷类
56. 动脉粥样硬化的治疗药物包括下列哪几种 ABCD

- A. 抗血小板药物    B. 抗凝药物    C. 扩张血管药物    D. 调整血脂药物
57. 下列病变中，可以出现肺动脉瓣区第二心音反常分裂的是 **AC**
- A. 急性广泛前壁心肌梗死    B. 先天性心脏病房间隔缺损    C. 完全性左束支传导阻滞    D. 先天性心脏病室间隔缺损
58. 下述肾脏病理类型中，可以出现新月体形成的有 **BCD**
- A. Alport 综合征    B. IgA 肾病    C. 急进性肾小球肾炎    D. 显微镜下多血管炎
59. 下列与肝硬化雌激素增多有关的是 **ABC**
- A. 男性睾丸萎缩，乳房发育    B. 女性月经失调、闭经、不孕    C. 肝掌、蜘蛛痣    D. 腹部静脉曲张
60. 糖尿病酮症酸中毒患者，治疗过程中如果补碱过多过快，会出现哪些严重并发症 **ABCD**
- A. 脑水肿    B. 加重组织缺氧    C. 碱中毒    D. 缺钾
61. 韦格纳肉芽肿患者，其肉芽组织中常见的细胞有 **ABC**
- A. 成纤维细胞    B. 浆细胞    C. 内皮细胞    D. Langhans 巨细胞
62. 下列符合早期胃癌的有 **AB**
- A. 肿瘤局限于黏膜层    B. 肿瘤累及黏膜下层    C. 肿瘤侵犯肌层    D. 肿瘤直径小于 3cm
63. HP 检测的方法有下列哪几种 **ABD**
- A. 活检标本快速尿素酶试验    B. 血清 Hp 抗体测定    C. 粪便做微氧环境下培养    D. 活检标本病理切片中寻找
64. 诊断原发性 IgA 肾病时，必须排除下列哪些疾病 **ABD**
- A. 过敏性紫癜肾炎    B. 薄基底膜肾病    C. 膜性肾病    D. 慢性酒精性肝硬化
65. 关于 M 蛋白，下列叙述正确的是 **BC**
- A. 均是由骨髓瘤细胞分泌的单株免疫球蛋白    B. M 蛋白可以导致机体凝血功能障碍    C. 可以通过固定免疫电泳确定 M 蛋白的种类    D. 血清 M 蛋白是多发性骨髓瘤诊断的必要条件

三、问答题：每小题 20 分，共 40 分。

1、简述治疗糖尿病药物分类、作用机制及代表药。

2、简述动脉粥样硬化的发病机制及诊断方法。

### 外科学（每题 1 分）

51.细胞外液的钠太多,而细胞外液容量不足,其临床表现为 \_

- A. 尿少、口渴、尿比重低            B. 尿少、口渴、尿比重正常  
C. 尿少、口渴、尿比重高            D. 尿多、口渴、尿比重高  
E. 尿多、口渴、尿比重正常

62.治疗等渗性脱水,大量输入等渗盐水可引起

- A. 低钾血症        B. 高钠血症        C. 高氯性酸中毒  
D. 低镁血症        E. 低钙血症

53.一女病人大面积烧伤,感头晕,疲乏,手足麻木,口渴不明显,查:血  $\text{Na}^+$ 125mmol/L,尿比重 1.005,诊断为

- A. 高渗性缺水            B. 低渗性缺水            C. 等渗性缺水  
D. 代谢性酸中毒        E. 低钾血症

54.在补液时,当尿量尚未检测时,不应补充的是

- A. 10%葡萄糖钙            B. 50%碳酸氢钠  
C. 10%氯化钾            D. 血浆清蛋白        E. 葡萄糖

55.当抗利尿激素和醛固酮分泌增加时,肾脏对

- A. 尿量、钠量和钾量的排出量均增加  
B. 尿量、钠量和钾量的排出量均减少  
C. 尿量、钠量排出减少,钾量排出增加  
D. 尿量、钾量排出减少,钠量排出增加  
E. 尿量排出增加,钠量和钾量的排出均减少

56.在低钾血症的治疗过程中,下列哪项是错误的

- A. 积极治疗原发病 B. 对无尿和少尿病人不得输钾盐  
C. 如缺钾严重,必要时静脉推注 10%氯化钾



D. 每 500ml 液体中含钾不超过 1.5g(20mmol)

E. 补钾速度不宜过快,控制在 20mmol/h 以下

57.高钾血症病人出现心律失常时,应给予

A. 静注 10%葡萄糖酸钙溶液 20ml      B. 静注 5% NaHCO<sub>3</sub> 溶液 80ml

C. 静注 11.2%乳酸钠溶液 50ml      D. 口服阳离子交换树脂

E. 静注 25%葡萄糖溶液 100ml+胰岛素 8u

58.人体血液中的缓冲系统 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>/H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 正常比值是

A. 10:1      B. 20:1      C. 30:1      D. 40:1      E. 50:1

59.关于代谢性酸中毒的病因,下列哪项是错误的

A. 主要发生于呼吸道梗阻      B. 主要由于体内 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>减少

C. 当循环与组织灌注不足时可以发生      D. 可发生于急性肾功能衰竭

E. 可发生于肠道液体大量丧失时

68.输血适应证哪项不正确

A. 贫血或低蛋白血症      B. 急性出血      C. 凝血机制障碍

D. 严重感染      E. 酸碱平衡失调

60.输血发生过敏反应,病人出现过敏性休克,血压为零时,处理原则首先为

A. 减慢输血速度,给予苯海拉明      B. 立即静脉补充液体

C. 尽早行气管切开      D. 立即停止输血,给予肾上腺素      E.

立即口服非那根

61.治疗与抢救休克首要的中心环节是

A. 应用血管活性药物      B. 应用纠酸药物

C. 积极去除病因,补充血容量      D. 应用肾上腺皮质激素

E. 应用肝素防止 DIC

62.休克的主要致死原因是

A. 多器官衰竭      B. 全身组织缺氧      C. 酸中毒

D. 合并感染      E. 全身广泛性出血

63.成人短时间内达到以下失血量时,才引起休克

A. 200 毫升      B. 400 毫升      C. 300 毫升      D.

800 毫升      E. 以上都不对

64.休克补液治疗后,临床上微循环改善的最重要指标是

A. 血压回升      B. 口渴减轻      C. 尿量增加      D.

呼吸、脉搏减慢      E. 肢端温度上升

65.休克的一般监测及临床意义,下列哪项不是

A. 精神状态:反映脑组织液灌流和全身循环状况的反映

B. 体重:反映机体代谢状态

C. 皮肤色泽、温度:是体表灌注情况的标志

D. 脉搏和血压:反映循环系统状况

E. 尿量:反映肾血液灌注情况的有用指标

66.休克时,快速(5-10分钟)静滴平衡盐液 500ml,如血压有所回升,而中心静压低于 5cmH<sub>2</sub>O,常提示

- A. 心功能不全            B. 血容量过多            C. 容量血管过度收缩  
D. 血容量不足            E. 血容量补足

67.能增强心肌收缩力,增加外周血管阻力,并能扩张肾血管的抗休克药物为

- A. 去甲肾上腺素    B. 654-2            C. 间羟胺            D.  
异丙基肾上腺素    E. 多巴胺

68.感染性休克主要由

- A. G+细菌产生的内毒素引起    B. G-细菌释放的外毒素引起  
C. 组织分解代谢产物引起        D. G-细菌释放的内毒素引起  
E. 大量细菌在血液中繁殖引起

69.急性胃粘膜损害的主要临床表现

- A. 腹痛、腹泻            B. 恶心、呕吐            C. 呕血、黑便  
D. 左上腹压痛,反跳痛            E. 以上都不是

70.麻醉前,为了预防呕吐和误吸,成人择期手术前必须

- A. 禁食 4h 禁饮 12h            B. 禁食 12h 禁饮 4h  
C. 禁食 8h 禁饮 8h            D. 禁食 12h 禁饮 12h  
E. 禁食 24h 禁饮 24h

71.有关麻醉前用药的目的,下列哪项不是

- A. 防止呼吸道并发症            B. 稳定病人情绪  
C. 加强麻醉效果            D. 减少麻药的副作用和毒性    E. 使麻醉过程平稳

72.颅骨骨折时出现熊猫眼征,主要见于

- A. 前颅窝骨折            B. 中颅窝骨折            C. 后颅窝骨折  
D. 凹陷性骨折            E. 线性骨折

73.诊断颅内动脉瘤主要的放射学检查方法

- A. X线平片            B. 头部CT            C. 脑核磁共振  
D. 全脑血管造影            E. 脑PET

74.甲状腺大部除术后,立即发生声音嘶哑说明

- A. 碘迟缓反应            B. 甲状腺危象先兆            C. 喉上神经内支损伤  
D. 喉返神经损伤            E. 血钙突然下降

75.甲状腺大部切除术后并发手足抽搐,预防关键在于

- A. 术前充分准备            B. 术前服碘剂使症状控制后再手术  
C. 切除甲状腺腺体时,尽量保留腺体背面部分的完整

D. 尽量保留甲状腺上下动脉与食管气道动脉的吻合支

E. 结扎甲状腺上下动脉时应尽量远离腺体

76. Pagets 病是

A. 导管内癌                      B. 髓样癌                      C. 大肝腺样癌

D. 乳头湿疹乳腺癌              E. 炎性乳癌

77. 甲状腺术后最危急的并发症是

A. 甲状腺危象              B. 手足抽搐              C. 喉返神经损伤

D. 喉上神经损伤              E. 术后呼吸困难和窒息

78. 下列哪项食管吞钡的 X 线表现，显示食管瘤已发展到晚期

A. 食管管腔狭窄、梗阻              B. 小龛影              C. 局限性管壁僵硬

D. 局限、小的充盈缺损              E. 局限性粘膜皱襞增粗和断裂

79. 一患者，男，43 岁，因胃溃疡行胃大部切除术，术后切口血肿，但尚未化脓，则该病人的切口为

A. I 类切口 / 丙级愈合              B. II 类切口 / 乙级愈合

C. II 类切口 / 丙级愈合              D. III 类切口 / 乙级愈合

E. III 类切口 / 丙级愈合

80. 一成年男子，在锅炉爆炸中被烧伤，被烧伤部位有面部、颈部、双手、双前臂。双足及双小腿，则该病人烧伤面积为

A. 24%              B. 30%              C. 40%              D. 37%              E. 47%

81. 处理破伤风的伤口时，下列哪项是错误的

A. 彻底清创术              B. 清除坏死组织和异物              C. 反复氧化剂冲洗伤口

D. 伤口应尽量予以缝合              E. 用 1% 高锰酸钾湿敷

82. 脓毒症血培养，抽血时间最好选择在

A. 发热开始上时              B. 发热最高峰时              C. 寒战结束时

D. 预计发生寒战、发热前              E. 寒战初起时

83. 深部脓肿的主要诊断依据是

A. 局部皮肤潮红              B. 局部有波动感              C. 局部压痛明显

D. 试验穿刺抽到脓液              E. 有全身症状

84. 联合应用抗生素，下列哪项是错误的

A. 联合以多为好              B. 能提高抗菌效果              C. 可降低药物剂量

D. 能防止或延迟药物出现而药性 E. 联合用药应避免敢用不敢停的弊病

E. 是什么性质的脏器受到损伤和是否为多发性损伤

85. 卵圆孔在解剖学上大多闭合的时间是

A. 生后 1~2 个月 B. 生后 3~4 个月 C. 生后 5~7 个月 D. 生后 8~9 个月 E. 生后 10~11 个月

86. 断发性腹膜炎最常见的病原菌是

A. 溶血性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 绿脓杆菌  
D. 大肠杆菌 E. 产生杆菌

87. 女, 60 岁、胃穿孔已 18 小时, 全腹压痛, 肌紧张, 肠鸣音消失, 处理为

A. 禁食, 胃肠减压观察 B. 腹腔引流术 C. 穿孔修补术  
D. 胃大部切除术 E. 输液, 抗菌素, 非手术治疗

88. 绞窄性肠梗阻的腹痛特点是

A. 阵发行绞痛 B. 持续性顿痛 C. 持续剧烈腹痛  
D. 放射性腹痛 E. 持续性隐痛, 阵发性胀痛

89. 急性阑尾炎腹痛发生的特点是

A. 左下腹痛转移到右下腹痛 B. 左上腹痛后右下腹痛  
C. 腹痛一开始即出现在右下腹部 D. 先上腹痛, 后右下腹痛  
E. 没有明确的特点

90. 急性阑尾炎上腹部及脐周疼痛是由于

A. 胃肠道痉挛 B. 腹膜炎症刺激  
C. 内脏功能紊乱 D. 合并急性胃肠炎 E. 内脏神经反射

91. 肛裂常发生在肛管的

A. 前正中位 B. 左侧位 C. 右侧位 D. 后正中位 E. 左前位

92. 原发性肝癌最常见的转移方式是

A. 侵犯门静脉分支, 经门静脉系统形成肝内播散 B. 肝外血行转移  
C. 淋巴转移 D. 腹腔种植 E. 直接向横膈蔓延

93. 正常婴儿, 前囟闭合的年龄是

A. 3~4 个月 B. 6~8 个月 C. 9~11 个月 D. 1~1.5 岁 E. 2~2.5 岁

94. 对原发性肝癌高危人群的筛查应采用

A. CT B. MRI C. AFP 与 B 超 D. 肝动脉造影 E. CEA

95. 肝内胆管结石

- A. 左肝管多于右肝管      B. 右肝管多于左肝管      C. 左右肝管相等  
D. 完全在左肝管      E. 完全在右肝管

96.患者女性，42岁，三年来经常夜间上腹部不适，2日前食油腻食物后突发上腹痛，为阵发性绞痛，畏寒，发热，呕吐，尿色逐渐加深。入院时体温38℃，轻度黄疸，腹稍胀，有右上腹压痛，肌紧张，肠鸣音弱，白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性80%，血清淀粉酶128单位（索氏法）最大可能是

- A. 高位急性阑尾炎      B. 溃疡病穿孔      C. 急性胰腺炎  
D. 急性胆囊炎      E. 胆道蛔虫病

97.引起上消化道上出血的原因不包括

- A. 胃十二指肠溃疡      B. 慢性胃炎      C. 门静脉高压症  
D. 出血性胃炎      E. 胃癌

98.胃十二指肠溃疡大出血的溃疡一般位于

- A. 胃大弯      B. 胃底后壁      C. 胃体后壁  
D. 胃小弯或十二指肠后壁      E. 十二指肠球部前壁

99.男性，10岁，突发性中上腹疼痛1小时，伴呕吐。查体：腹软，中上腹有轻度深压痛，无肌紧张及反跳痛，拟诊为

- A. 胆石症      B. 胃溃疡穿孔      C. 急性胃肠炎  
D. 胆道蛔虫病      E. 急性肠梗阻

100.男性，66岁，中上腹疼痛6小时，伴畏寒、高热2小时，以往曾行胆囊切除术。查体：T: 39.6℃，腹软，剑突下及右上腹均有压痛，有轻度肌紧张及反跳痛，肝区叩击痛阳性，白细胞： $13.9 \times 10^9/L$  中性粒89%，拟诊为

- A. 急性消化道溃疡穿孔      B. 急性坏疽性阑尾炎  
C. 急性绞窄性肠梗阻      D. 急性梗阻性化脓性胆管炎  
E. 急性出血性坏死性胰腺炎

101.女性，35岁，腹痛5小时来诊，经检查诊断为外科急腹症，下列哪项决定是正确的

- A. 粘连性肠梗阻不需要手术治疗  
B. 消化道穿孔不是部腹探查的绝对指征  
C. 先有发热的急必腹痛一般是外科急腹症，均须手术治疗  
D. 疑为绞窄性肠梗阻时不可手术治疗，必须诊断明确后才可手术  
E. 急性胰腺炎是否手术治疗要根据血淀粉酶的测定结果而定

102.女性，54岁，因上腹部剧痛，休克2小时入院。查体：巩膜轻度黄染，重度

腹胀，肠鸣音消失，移动性浊音（±），血糖 11mmol/L，血钙 1.4mmol/L，CO<sub>2</sub>结合力 30mmol/L，血淀粉酶 1250 温氏单位，心电图示：T 波倒置，ST 段下降。

拟诊为

- A. 急性水肿性胰腺炎
- B. 心肌梗死，心源性休克
- C. 急性坏死性胰腺炎
- D. 胃穿孔伴弥漫性腹膜炎，感染性休克
- E. 急性梗阻性化脓性胆管炎

103.急性胰腺炎炎症波及整个胰腺，主要表现为

- A. 腹部压痛
- B. 一般情况差
- C. 呕吐
- D. 腹胀和肠鸣音稍减弱
- E. 剧烈的全上腹痛并呈束带状向两侧腰背部放射

104.腹主动脉瘤的常见病因是

- A. 外伤
- B. 动脉粥样硬化
- C. 感染
- D. Marfan 综合征
- E. 遗传

105.下肢静脉曲张晚期的临床表现中，最主要的是

- A. 皮肤厚硬
- B. 小腿浮肿
- C. 色素沉着
- D. 小腿下 1/3 内侧溃疡
- E. 局部瘙痒

106.间隙性跛行可发生于

- A. Raynaud 病
- B. Takayasu 病
- C. Raynaud 综合征
- D. Buerger 病
- E. 大隐静脉曲张

107.根据胸部创伤分类，下列属于开放性损伤的是

- A. 胸部皮肤有伤口，肺压缩 40%
- B. 气胸伴皮下气肿
- C. 肋骨骨折并气胸
- D. 肋骨骨折并血胸
- E. 心包填塞

108.肋骨骨折最重要的治疗原则是

- A. 骨折复位
- B. 骨折固定
- C. 功能锻炼
- D. 促进骨折愈合
- E. 预防及治疗并发症

109.某患者左前胸部刀刺伤 2 小时后，感胸闷气短，查体：面色苍白，四肢湿冷，心率 120 次/min，血压 80/70mmhg。颈静脉怒张，首先考虑

- A. 胸内大出血
- B. 血气胸
- C. 开放性气胸
- D. 肺裂伤
- E. 急性心包填塞

110.脓胸的致病菌多来自

- A. 肺内的感染灶
- B. 胸腔内其他脏器的感染灶
- C. 纵隔内脏器的感染灶
- D. 身体其他部位的感染灶
- E. 胸腔手术污染

111.早期肺癌首选的治疗方法是

A. 手术切除 B. 放射 C. 化学治疗 D. 免疫 E. 中药

112. 关于桡骨小头半脱位的临床表现，下列哪项描述是错误的

A. X 线检查(+) B. 有被他人牵拉史，伤后患肘不愿活动 C. 局部无明显肿胀及畸形 D. 局部有明显压痛 E. 患肘略屈曲，前臂略前旋

113.食管癌病人有持续性胸背痛，多表示

A. 癌肿部有炎症 B. 癌肿已侵犯食管外组织 C. 有远处血行转移  
D. 癌肿 E. 食管气管瘘

114.晚期食管癌的一般 X 线表现是

A. 食管粘膜呈串珠样改变，食管蠕动尚好  
B. 食管出现充盈缺损，管腔狭窄梗阻  
C. 食管下端呈光滑的鸟嘴样狭窄  
D. 食管呈不规则线样狭窄  
E. 食管移位，狭窄，粘膜正常

115.胸腺瘤好发于

A. 前下纵隔 B. 中纵隔 C. 后纵隔 D. 前上纵隔 E. 纵隔各部均可发生

116.体外循环没有哪项作用

A. 泵血 B. 气体交换 C. 降低和升高血液温度  
D. 酸碱平衡 E. 超滤

117.Horner 综合征是由于胸主动脉瘤压迫而产生

A. 膈神经 B. 脊神经 C. 喉返神经  
D. 交感神经 E. 迷走神经

118.排尿中断的症状常见那种疾病

A. 膀胱癌 B. 肾结石 C. 输尿管结石  
D. 膀胱结石 E. 阴茎癌

119.切除积水肾的参考指标，大部分肾皮质厚度是

A. <3mm B. <5mm C. <2mm D. >3mm E. >2mm

120.判断肾损伤的程度，主要依靠

A. 血尿程度 B. 尿路 X 线平 C. 排泄性尿路造影、肾 B 超、CT 检查  
D. 腹部可扪及包块 E. 取决于外伤方式

121. 骨盆骨折后最易受到损伤的尿道部位是

- A. 悬垂部尿道      B. 尿道球部      C. 尿道外口  
D. 尿道膜部      E. 全段尿道

122. 哪一种肾脏感染性疾病需手术处理

- A. 急性肾盂肾炎      B. 慢性肾盂肾炎      C. 急性肾周围炎  
D. 肾皮质炎      E. 肾积脓

123. 下列泌尿系统疾病中哪一种的病理改变主要在肾脏而出现症状则主要由膀胱病变引起

- A. 肾脏鹿角形结石      B. 海绵肾      C. 泌尿系结核  
D. 急性细菌性膀胱炎      E. 多囊肾

124. 70岁，男性进行性排尿困难四年，多次出现过急性尿潴留，目前排尿呈点滴状，前列腺明显增大，质软，弹性，残余尿300毫升，患者有冠心病已数年，时有心律不齐和心绞痛发作，最好采用哪种治疗方法

- A. 用女性激素      B. 长期留置导尿管      C. 耻骨上膀胱造瘘  
D. 前列腺切除      E. 双侧睾丸切除

125. 某青年长跑后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿，最大可能是

- A. 肾肿瘤      B. 输尿管肿瘤      C. 膀胱肿瘤  
D. 上尿路结石      E. 下尿路结石

126. 检查精索静脉曲张的患者，应采取

- A. 俯卧位      B. 左侧卧位      C. 右侧卧位      D. 平卧位      E. 站立位

127. 男性，30岁，因上腹部疼痛并向两侧放射6小时后来诊，查体：体温38.2℃，脉搏80次/分，上腹部压痛，反跳痛、肌紧张，下列哪项无助于急性胰腺类的诊断

- A. 发病前曾进食大量油腻食物      B. 既往有慢性胃炎病史  
C. 既往有胆石症病史      D. 1天前有中上腹部受撞经历  
E. 发病前饮酒1瓶

128. 女性，36岁，在家中切菜时不慎切伤左手中指，前来就诊，查体见：左中指创面整齐，末节余2/3，指骨外露，以下处理方法中哪个不恰当

- A. 清创后缩短指骨，缝合皮肤      B. 清创后用皮瓣移植闭合创口  
C. 清创后用胸壁带蒂皮瓣移植覆盖创口      D. 清创后用凡士林纱布包扎  
E. 清创后邻指皮瓣移植

129. 下列骨折的并发症中哪一个不是早期发生的

- A. 休克      B. 损伤性骨化      C. 感染



D. 内脏损伤 E. 周围神经损伤

130. 在脊髓损伤中，下列哪个表现是最不可能出现的

- A. 双上肢瘫痪 B. 双下肢瘫痪 C. 四肢瘫痪  
D. 节段性瘫痪 E. 截瘫

131. 下面关于骨折愈合标准的叙述中不正确的是 (E)

- A. 局部无压痛及纵向叩击痛  
B. 局部无反常活动  
C. X线显示骨折线模糊，有连续性骨痂通过骨折线  
D. 连续观察两周骨折处不变形  
E. 外固定解除后下肢能不扶拐在平地连续步行 2 分钟，且不少于 20 步

132. 下列哪一项不是造成半月板损伤的因素

- A. 半屈 B. 内收外展 C. 挤压 D. 旋转 E. 直立

(133~135 共用题干)

133. 男，35 岁，从高处跳下时，双下肢顿时感到无力在急诊室骨科首先做的影像学检查是

- A. MRI B. CT C. 核素骨扫描  
D. X 线 E. B 型超声

134. 急救运送的方法是

- A. 双人扶着让病人走 B. 一人背着运送 C. 一人抱着运送  
D. 一人抬头，一人抬脚运送 E. 躺在木板床上运送

135. 如果检查显示胸椎压缩性骨折，并有骨块进入椎管，应采取的治疗方法

- A. 牵引 B. 仰卧硬板床，背部垫高 C. 双桌法过伸复位  
D. 早期背伸锻炼 E. 及早手术解除脊髓压迫

问答题：

136. 简述外科围手术期处理的目的是与原则及术后主要并发症：(20 分)

137. 简述急性阑尾炎的病因、临床病理分型、主要临床表现、诊断及处理原则 (15 分)

137. 简述急性阑尾炎的病因、临床病理分型、主要临床表现、诊断及处理原则