

电子科技大学  
2016 年攻读硕士学位研究生入学考试试题  
考试科目：695 口腔综合

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、 名词解释：（8 题，每题 5 分）

1. Dental plaque
2. Biological width
3. 双膦酸盐性颌骨坏死
4. 翼丛
5. Osteointegration
6. junctional epithelium
7. 尖牙保护牙合
8. 眶耳平面

二、 选择题：（100 题，每题 2 分）

1. 室性心律失常病员首选的局麻药是
  - A. 利多卡因
  - B. 普鲁卡因
  - C. 的卡因
  - D. 布比卡因
  - E. 卡波卡因
2. 口内注射法进行下牙槽神经阻滞麻醉时，注射器应
  - A. 放在同侧第一二双尖牙之间，与中线呈 45° 角，注射针高于下颌牙合面 1cm 并与之平行；
  - B. 放在对侧第一二双尖牙之间，与中线呈 45° 角，注射针高于下颌牙合面 1cm 并与之平行；
  - C. 放在同侧侧切牙与尖牙之间，注射针高于下颌牙合面 1cm 并与之平行；
  - D. 放在对侧侧切牙与尖牙之间，注射针高于下颌牙合面 1cm 并与之平行；
  - E. 放在左右中切牙之间，注射针高于下颌牙合面 1cm 并与之平行；
3. 对于拔牙创的处理，不正确的方法是
  - A. 拔除乳牙残根后彻底搔刮牙槽窝
  - B. 刮净拔牙创内的碎片
  - C. 撕裂的牙龈组织应给予缝合
  - D. 与骨膜牙龈相连的骨折片应复位保留
  - E. 刮净拔牙创内的肉芽
4. 下哪种情况应暂缓拔牙
  - A. 高血压血压控制在 160/100Hg 以下
  - B. 妊娠第 4、5、6 月
  - C. 糖尿病的血糖 8.0mmol/L，尿糖 (+)，无酸中毒
  - D. 急性智齿冠周炎伴嚼肌间隙感染
  - E. 甲亢治疗后心率低于 100 次/分
5. 眼睑撕裂伤伴有小的组织缺损时，应
  - A. 直接拉拢缝合
  - B. 大针粗线缝合，缝合的深一些，带的组织多些
  - C. 褥式缝合加间断缝合，以充分减张
  - D. 尽量将组织复位，组织缺损处进行游离植皮以关闭创面
  - E. 组织缺损应当转移邻近皮瓣
6. 腺样囊性癌描述不正确的是

- A. 肿瘤易沿神经血管束扩散
  - B. 肿瘤侵袭性强，与周围组织无明显界限
  - C. 肿瘤易侵入血管，造成血行转移
  - D. 肿瘤颈淋巴结转移早，且发生率高
  - E. 肿瘤可沿骨髓腔侵袭
- 7. 治疗颌骨骨折的基本标准是：**
- A. 解剖复位
  - B. 恢复原有的咬合关系
  - C. 达到理想的咬合关系
  - D. 保证良好的咀嚼功能
  - E. 保证良好的语言功能
- 8. 口腔颌面部损伤患者，有昏迷史，清醒一段时间后出现头痛加剧，不安，进而嗜睡，再次进入昏迷，应首先考虑**
- A. 脑震荡
  - B. 脑挫裂伤
  - C. 蛛网膜下水肿
  - D. 硬脑膜外水肿
  - E. 脑水肿
- 9. 早期浸润邻近的神经和血管的肿瘤是**
- A. 多形性腺瘤
  - B. 粘液表皮样癌
  - C. 恶性混合瘤
  - D. 腺样囊性癌
  - E. 基底细胞腺癌
- 10. 为防止甲状舌管囊肿或瘻的术后复发，手术应**
- A. 完整摘除囊肿
  - B. 追踪瘻管到舌骨表面结扎
  - C. 囊肿在舌骨表面剥离干净
  - D. 切除囊肿及舌骨中段，并妥善处理舌骨以上部分
  - E. 以上都不对
- 11. 环磷酰胺细胞类可引起明显的骨髓抑制，应定期复查血象，当白细胞降到以下水平时应停药**
- A.  $1 \times 10^9/L$
  - B.  $2 \times 10^9/L$
  - C.  $3 \times 10^9/L$
  - D.  $4 \times 10^9/L$
  - E.  $5 \times 10^9/L$
- 12. 目前，多主张在什么年龄行腭裂整复术**
- A. 6 月龄
  - B. 18 个月左右
  - C. 3 岁左右
  - D. 5~6 岁
  - E. 8~12 岁
- 13. 游离皮片越厚，则**
- A. 收缩越大
  - B. 越能耐受摩擦
  - C. 色泽变化越大
  - D. 越容易成活
  - E. 质地越脆
- 14. 缝合时出现创缘内卷的主要原因是：**
- A. 缝合过深

- B. 打结过紧
- C. 组织富裕
- D. 两侧进针浓度不一致
- E. 皮肤切口两侧进针间距大于皮下距离
- 15. **舌下囊肿的处理目前常用**
  - A. 袋性缝合
  - B. 尽可能摘除囊肿
  - C. 完全摘除囊肿
  - D. 摘除舌下腺
  - E. 引流囊液
- 16. **弹性模量最接近人牙本质的材料是**
  - A. 银汞合金
  - B. 磷酸锌水门汀
  - C. 复合树脂
  - D. 磷灰石陶瓷
  - E. 氧化锆陶瓷
- 17. **对于石膏模型材料，其混水率越大，则**
  - A. 凝固时间越长，强度越高
  - B. 凝固时间越短，强度越高
  - C. 凝固时间越长，强度越低
  - D. 凝固时间越短，强度越低
  - E. 凝固时间越长，强度不变
- 18. **人工牙排列要有平衡的主要原因是**
  - A. 增大接触面积
  - B. 提高咀嚼效率高
  - C. 有利于义齿稳定
  - D. 使义齿美观
  - E. 纠正偏咀嚼习惯
- 19. **关于 RPA 卡环，下列描述中错误的是**
  - A. 常用于远中游离端义齿
  - B. 基牙下存在有软组织倒凹
  - C. 口腔前庭深度不足
  - D. 卡环臂的坚硬部分位于观测线上方
  - E. 卡环臂坚硬部分与观测线上缘接触
- 20. **固定桥金属基底试戴时如果与基牙不密合而出现翘动，则处理办法为**
  - A. 调改基牙牙体形态后继续下一步制作
  - B. 调改金属基底桥架以后继续下一步制作
  - C. 磨改金属基底桥架边缘后继续下一步制作
  - D. 重新取模制作金属基底桥架
  - E. 继续制作，日后用粘固剂填充牙体组织与固定桥金属基底桥架之间不密合的部位
- 21. **试戴固定义齿时检查触点的最好方法是**
  - A. 咬合纸检查触点
  - B. 摄 X 片观察
  - C. 牙线检查相邻牙的接触关系
  - D. 探针探寻相邻牙接触情况
  - E. 试戴以后调改
- 22. **有关桥体的说法哪一项是错误的**
  - A. 应有良好的自洁作用
  - B. 适当减少桥体宽度
  - C. 在牙合力的作用下易发生抗压变形
  - D. 应满足美观和舒适的要求

- E. 后牙桥体的颊侧可适当扩大邻间隙
23. 在实际工作中，常用于分离石膏与塑料材料的分离剂是
- A. 藻酸盐水溶液
  - B. 皂甲溶液
  - C. 甘油
  - D. 凡士林
  - E. 乙二醇
24. 下列关于可摘局部义齿基托的叙述，你认为哪项是错误的
- A. 在保证义齿固位与稳定的前提下，基托应尽量减小，提供舒适性
  - B. 基托的磨光面应设计为凹面，有助于义齿的固位与稳定
  - C. 舌腭侧基托的边缘应进入天然牙舌腭侧倒凹，以利于义齿的固位
  - D. 基托组织面应对牙槽嵴硬区和骨突等地方进行缓冲，以免牙龈组织受压疼痛
  - E. 整铸支架义齿的基托厚度一般为 0.5mm，塑料基托厚度一般为 2mm
25. 下颌呈习惯性前伸、颌关系不稳定的患者确定颌关系时应注意
- A. 采用患者的习惯位
  - B. 利用旧义齿确定
  - C. 帮助患者下颌后退
  - D. 面下 1/3 的高度
  - E. 颌骨的垂直关系
26. 牙列缺失后，软组织将出现改变，以下哪项是不易发生的
- A. 唇颊沟变深
  - B. 舌沟间隙变浅
  - C. 鼻唇沟变深
  - D. 舌形态改变
  - E. 磨牙后垫位移
27. 一患者多数下后牙缺失，前牙松动，舌侧倒凹明显，口底到龈缘的距离 6mm，大连接体宜用
- A. 倒凹区之上的舌杆
  - B. 离开粘膜表面，与牙槽嵴平行的舌杆
  - C. 与粘膜平行的接触的舌杆
  - D. 舌板
  - E. 都不适宜
28. 下颌体牙槽窝骨板的特点是
- A. 内外壁由致密而较薄的皮质骨构成
  - B. 下前牙区的牙槽窝唇侧骨板较舌侧厚
  - C. 下前磨牙区的牙槽窝颊侧骨板较舌侧厚
  - D. 下磨牙区的牙槽窝颊侧骨壁有外斜线增强
  - E. 下颌第三磨牙舌侧骨壁较厚
29. 在 PFM 修复体制作时金属底冠太薄，会导致
- A. 瓷收缩会引起金属基底变形
  - B. 受力时会发生碎裂
  - C. 降低金瓷界面热稳定性
  - D. 易致瓷裂
  - E. 以上都是
30. 制作合金嵌体，牙体预备洞形的特征
- A. 洞形无倒凹，底平壁直；
  - B. 洞壁预备成  $< 2^\circ$  的外展，洞缘不做斜面；
  - C. 洞壁预备成  $< 5^\circ$  的外展，洞缘形成斜面；

- D. 洞壁预备成 $< 5^\circ$ 的外展，洞缘长斜面；  
E. 洞壁预备成 $< 5^\circ$ 的外展，洞缘无斜面。
31. 颞下颌关节盘不可复性移位，开口受限时，选用的咬合板为
- A. 稳定咬合板  
B. 再定位咬合板  
C. 枢轴咬合板  
D. 软弹性咬合板  
E. 松弛咬合板
32. 下述哪种变化不是扁平苔藓的病理表现
- A. 上皮钉突不规则伸长  
B. 基底细胞液化变性  
C. 基底膜界限不清  
D. 棘细胞内疱形成  
E. 胶样小体出现
33. 下述哪种变化不可能出现在慢性盘状红斑狼疮时
- A. 角质栓形成  
B. 基底细胞液化变性  
C. 基底膜模糊  
D. 血管内玻璃样栓塞  
E. 固有层淋巴细胞浸润带
34. 与天疱疮比较下述哪项为类天疱疮的特征性改变
- A. 大量淋巴细胞浸润  
B. 大量浆细胞浸润  
C. 大量嗜酸细胞浸润  
D. 上皮剥脱后，表面遗留基底层  
E. 上皮全层剥脱，表面为平滑的结缔组织
35. 下述哪项不是毛状白斑的病理表现
- A. 上皮钉突肥厚，伸长  
B. 棘细胞增生  
C. 棘细胞内出现角化细胞或角化珠  
D. 棘细胞气球样变  
E. 过度不全角化形成刺状突起
36. 下述哪项不是结合上皮的特征
- A. 无角化  
B. 钉突较短  
C. 胞浆中张力细丝较少  
D. 细胞间的桥粒较少  
E. 在龈沟底部约 10 层细胞
37. 在牙周膜中，哪一种细胞能增殖成颌骨囊肿或牙源性肿瘤
- A. 成纤维细胞  
B. 间质细胞  
C. 成骨细胞

D. Malassces 上皮剩余

E. 成上骨质细胞

**38. 朗格汉斯细胞电镜下称为明细胞是因为**

A. 电镜下朗格汉斯细胞胞浆电子密度较高

B. 电镜下朗格汉斯细胞胞浆电子密度较低

C. 电镜下朗格汉斯细胞胞浆中朗格罕颗粒少

D. 电镜下朗格汉斯细胞胞浆中朗格罕颗粒多

E. 电镜下朗格汉斯细胞胞浆中各种细胞器均被破坏

**39. 釉质中无机物约占总重量的**

A. 70%

B. 50%

C. 96%

D. 86%

E. 75%

**40. 牙根发育开始于下列哪个时期**

A. 钟状期

B. 颈环形成后

C. 上皮根鞘形成前

D. 釉质完全形成之后

E. 牙本质形成之前

**41. 良性多形性腺瘤癌变占恶性多形性腺瘤总数的**

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

E. 90%

**42. 牙本质在近髓侧和近表面单位面积内小管数目之比为**

A. 2: 1

B. 1: 4

C. 4: 1

D. 1: 2

E. 1: 1

**43. 下列哪种疾病又称为白塞综合征**

A. 重症多形渗出性红斑

B. 口眼生殖器三联综合征

C. 韦格内肉芽肿

D. 腺周口疮

E. 良性黏膜类天疱疮

**44. 下列哪项不是艾滋病的口腔表现**

A. 念珠菌病

B. 毛状白斑

C. 坏死性龈炎

- D. 牙周炎
- E. 红斑狼疮

**45. 高分化鳞状细胞癌的特点有**

- A. 核分裂像多
- B. 胞核和细胞多极性不明显
- C. 细胞间桥不显著
- D. 几乎没有细胞间桥
- E. 细胞及核多形性明显

**46. Kennedy 第一类的设计应重点考虑的问题是:**

- A. 人工牙的位置
- B. 基托伸展范围
- C. 卡环数目
- D. 防止义齿合向脱位
- E. 防止义齿沿纵轴、垂直轴和主要支点旋转

**47. X 线片上呈透射的是**

- A. 牙胶
- B. 氧化锌
- C. 塑化液
- D. 磷酸锌水门汀
- E. 氢氧化钙

**48. 与 1 型糖尿病人牙周破坏严重程度有关的因素是**

- A. 糖尿病的类型
- B. 代谢控制的程度
- C. 糖尿病病程的长短
- D. 有无全身并发症
- E. 以上均是

**49. 世界卫生组织推荐在用于牙周病流行病学调查的指数是**

- A. SBI
- B. PD
- C. CPITN
- D. AL
- E. PLI

**50. IV 度根分叉区病变, 最不需做哪项治疗**

- A. 牙龈切除术
- B. 牙周翻瓣手术
- C. 洁治术
- D. 刮治术
- E. 根面平整术

**51. 对诊断梅毒无特异性的检查是**

- A. 螺旋体检查
- B. 华氏试验
- C. 康氏试验

- D. 絮状沉淀玻片法  
E. 外周血常规白细胞计数
52. 目前认为菌斑中最主要的致龋菌是
- A. 乳酸杆菌  
B. 血链球菌  
C. 涎链球菌  
D. 葡萄球菌  
E. 变形链球菌
53. 急性牙髓炎与急性根尖周炎鉴别的主要依据是
- A. 牙髓活力情况  
B. 疼痛的性质  
C. 有无龋齿  
D. 有无外伤  
E. X线检查
54. 患者因后牙深龋洞一次垫底银汞充填，术后一直冷热痛2周，复诊时叩(+)，去除原充填物，未见穿髓孔，氧化锌丁香油糊剂安抚，仍有冷热刺痛不缓解，其原因可能为
- A. 充填材料选择不当  
B. 未调合  
C. 洞形制备不当  
D. 诊断失误  
E. 腐质未去净
55. 患者30岁，A6因深髓治疗时不慎意外穿髓，穿髓孔一钻针大小。该患牙应如何处理
- A. Ca(OH)<sub>2</sub>制剂直接盖髓，羧酸水门汀垫底，银汞合金充填  
B. Ca(OH)<sub>2</sub>制剂直接盖髓，氧化锌丁香油糊剂安抚  
C. Ca(OH)<sub>2</sub>制剂直接盖髓，玻璃离子水门汀充填  
D. 活髓切断术  
E. 牙髓治疗
56. 有关多形渗出性红斑下列哪项描述是错误的
- A. 是一种变态反应性疾病  
B. 口腔黏膜表现为大面积糜烂  
C. 皮肤损害为红斑、水疱，亦可见丘疹  
D. 眼部病损为虹膜睫状体炎及前房积脓  
E. 可伴有明显的全身反应，如高热、头痛等
57. 女性，35岁。诉下唇左侧疼痛破溃4天，影响进食。同样病史每年发作3~6次。口腔检查：下唇左侧黏膜可见一个直径4mm的溃疡，周边红，溃疡表面有黄色假膜，溃疡底部微凹陷，触痛明显。临床可诊断为
- A. 复发性轻型阿弗他溃疡  
B. 复发性疱疹样口炎  
C. 复发性重型阿弗他溃疡  
D. 多形性红斑  
E. 疱疹性口炎
58. 要想影响上皮细胞的连接和营养，浸润的白细胞需要达到结合上皮体积的
- A. 20%  
B. 30%  
C. 40%  
D. 50%  
E. 60%
59. 口腔白色念珠菌感染患者，选用哪种漱口剂？



- A. 含抗生素漱口水
- B. 含止痛剂漱口水
- C. 激素制剂漱口水
- D. 弱酸性漱口水
- E. 弱碱性漱口水

60. 氟牙症与釉质发育不全的区别主要为

- A. 病因不同
- B. 表现不同
- C. 牙位不同
- D. 牙面不同
- E. 部位不同

61. 下颌第一前磨牙的最显著的解剖标志是

- A. 体积最小
- B. 舌面短小
- C. 横嵴
- D. 舌尖特小
- E. 牙合面呈卵圆形

62. 覆盖是指

- A. 牙尖交错牙合时，上、下颌前牙发生重叠的关系
- B. 牙尖交错牙合时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面的水平距离
- C. 牙尖交错牙合时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面的垂直距离
- D. 前伸咬合时，下颌前牙切缘超过上前牙切缘的水平距离
- E. 下颌前伸，上、下颌前牙对刃时下颌运动的水平距离

63. 喙突附着的肌

- A. 咬肌
- B. 翼内肌
- C. 颞肌
- D. 颞肌和咬肌
- E. 以上都不正确

64. 关于颞下颌关节关节盘描述错误的是

- A. 在关节窝和髁突之间
- B. 内外径大于前后径
- C. 厚度不一致
- D. 从前到后有 4 个分区
- E. 有前带、中间带、中后带和双板区 4 个分区

65. 颈神经丛浅支中最大者为

- A. 枕小神经
- B. 耳大神经
- C. 颈皮神经升支
- D. 锁骨上神经
- E. 颈皮神经降支

66. 寻找颈孔时常以 ( ) 为标志:

- A. 下颌中切牙
- B. 下颌侧切牙
- C. 下颌尖牙
- D. 下颌前磨牙
- E. 下颌磨牙

67. 上颌中切牙的发育沟描述正确的是

- A. 切 1/2 见两条纵行的发育沟
- B. 切 1/3 见两条纵行的发育沟
- C. 切 1/2 见一条纵行的发育沟
- D. 切 1/3 见一条纵行的发育沟
- E. 无发育沟

68. 上颌神经依其行程可分为 4 段其中不包括

- A. 颅中窝段
- B. 翼腭窝段
- C. 眶下管段
- D. 面段
- E. 翼肌段

69. 下颌第一乳磨牙牙合面边缘最短的是

- A. 近中边缘嵴
- B. 远中边缘嵴
- C. 颊侧边缘嵴
- D. 舌侧边缘嵴
- E. 各边缘嵴一样长

70. 能引起药物性牙龈增生的药物是

- A. 苯妥英钠
- B. 苯妥英钠+硝苯地平
- C. 苯妥英钠+环孢素
- D. 硝苯地平+环孢素
- E. 苯妥英钠+硝苯地平+环孢素

71. 颌下三角内的有关重要结构在舌骨舌肌浅面自下而上的依次排序是

- A. 舌下神经、颌下腺导管、舌神经
- B. 舌神经、颌下腺导管、舌下神经
- C. 舌下神经、舌神经、颌下腺导管
- D. 舌神经、舌下神经
- E. 颌下腺导管、舌神经、舌下神经

72. 颈部肿块患者，出现声嘶，舌偏患侧，最可能哪些神经末梢受侵犯( )

- A. 第 X、XI 脑神经
- B. 第 IX、X 脑神经
- C. 第 VI、X 脑神经
- D. 第 X、XII 脑神经
- E. 第 IX、XII 脑神经

73. 颊间隙感染波及及时，炎症发展迅速

- A. 颊脂垫
- B. 嚼肌
- C. 腮腺导管
- D. 邻近牙周组织
- E. 颧面部

74. 上前牙冠折位于龈下 3mm，X 线片显示断面位于牙槽骨下 1mm，修复时可采用

- A. 树脂修复折断部分
- B. 牙根牵引至牙龈上后修复
- C. 牙龈切除后修复
- D. 根管桩修复
- E. 将原有断牙清理后粘结

75. 一急性右后牙痛患者，就诊时分不清上下患牙，而检查时右侧上下后均有多个龋坏和冷热测敏感的患牙。如何鉴别该患者主诉牙是在上颌或下颌（ ）

- A. 温度测验
- B. 电活力测验
- C. X 线片检查
- D. 麻醉法测验
- E. 染色体测验

76. 正确确定垂直距离的目的，下列哪一项是错误的

- A. 面部和谐，肌张力正常
- B. 充分发挥咀嚼肌的力量
- C. 防止颞颌关节病变
- D. 防止咬舌、咬腮
- E. 防止牙槽骨吸收

77. 龋病资料整理一般不以哪项分组

- A. 年龄
- B. 文化程度
- C. 性别
- D. 城乡
- E. 民族

78. 酚醛树脂塑化液第Ⅲ液是

- A. 间苯二酚
- B. 甲醛
- C. 95%酒精
- D. 过饱和的氢氧化钠液
- E. 甲酚甲醛

79. 患者女，32 岁，牙龈肿物 3 个月，镜下见病变由大量新生毛细血管及成纤维细胞组成，有多数炎症细胞浸润，表面上皮变薄。病理上最符合

- A. 纤维性龈瘤
- B. 血管性龈瘤
- C. 妊娠性龈瘤
- D. 肉芽肿性龈瘤
- E. 巨细胞性龈瘤

80. 在牙体修复后造成充填体折断或脱落的原因是

- A. 未使用垫底材料
- B. 未使用洞衬材料
- C. 未使用楔子
- D. 未使用形片
- E. 抗力形和固位形差

81. 牙髓纤维主要是

- A. 胶原纤维
- B. 弹力纤维
- C. 嗜银纤维
- D. 胶原纤维和弹力纤维
- E. 胶原纤维和嗜银纤维

82. 在基本的牙膏成分组成中没有

- A. 摩擦剂
- B. 洁净剂
- C. 甜味剂
- D. 凝固剂
- E. 湿润剂

83. Bolton 指数是

- A. 分析牙弓拥挤度
- B. 测量牙齿大小协调性
- C. 牙弓对称性的测量分析
- D. 预测上牙弓的宽度
- E. 预测未萌上下尖牙与双尖牙的宽度

84. 患者，2 周前，因龋坏去医院做后牙复面洞银汞合金充填。术后一直有咬物酸痛。查见患牙充填体上有亮点，叩诊轻度不适。医师首选的治疗是

- A. 去充填物做检查
- B. 去充填体再充填
- C. 调去充填体高点
- D. 去充填体做安抚
- E. 麻醉下牙髓治疗

85. 一患者活动义齿修复，出现摘戴困难，需调整的部位有

- A. 牙合支托
- B. 卡环
- C. 人工牙
- D. 非倒凹区基托
- E. 基牙

86. 患者左侧关节弹响 1 年，制作稳定性咬合板治疗，不正确的处理有

- A. 在正中咬合时只与对颌的功能尖呈点状接触
- B. 咬合板厚度在第二磨牙中央窝处保持 2mm
- C. 可用于上颌或下颌
- D. 第二磨牙区与对颌牙有尖窝接触关系，其余牙无接触
- E. 疗程 6 个月无效，考虑其余治疗

87. 在翼外肌附着处上方发生的髁状突骨折，如无明显移位，通常采用

- A. 颌间牵引固定
  - B. 在患侧磨牙区垫上橡皮垫，用颌间弹性牵引复位固定法，使下颌骨下降
  - C. 吊颌绷带限制下颌活动，保持正常咬合关系即可
  - D. 在耳屏前做切口，进行手术切开复位内固定
  - E. 在下颌角前方的下颌骨下缘处做小切口，采用克氏针进行固定
- 88. 患者男，29岁因外伤致前牙折断，检查：A1冠折，其折裂线约在龈下3.5mm，若进行桩冠修复，除作牙髓治疗外，还应做**
- A. 龈修整术
  - B. 龈切除术
  - C. 牙周塞治
  - D. 洁牙
  - E. 以上都不需要
- 89. 患者戴全口义齿1年后觉恶心，以往未曾有此现象，未发现全身疾病，最可能的原因是**
- A. 前牙早接触导致义齿后缘轻微翘动
  - B. 上总义齿后缘不密贴
  - C. 上总义齿后缘过长
  - D. 上总义齿舌侧翼缘区太长太厚
  - E. 义齿固位差
- 90. 一患者上颌局部义齿修复，义齿戴时，发现上腭后部弯制的腭杆离开腭黏膜2mm，处理方法是**
- A. 不做处理，让患者把义齿戴走
  - B. 腭杆组织面加自凝树脂重衬
  - C. 腭杆组织面缓冲
  - D. 取下腭杆
  - E. 取下腭杆后，戴义齿取印模，在模型上重新加腭杆
- 91. 当患者行金属烤瓷固定桥修复后，应告知患者下列医嘱，除了**
- A. 避免使用刷毛过硬的牙刷刷牙
  - B. 尽量避免咬过硬的食物
  - C. 正确使用牙线
  - D. 若有色素沉着于义齿瓷面上，可用小刀刮去
  - E. 注意义齿的清洁卫生
- 92. 患者腭前部肿胀半年，X线片示腭中线前部一圆形投射区，镜下见衬里上皮为复层鳞状上皮和假复层纤毛柱状上皮，最有可能的诊断是**
- A. 鼻腭管囊肿
  - B. 鼻唇囊肿
  - C. 球状上颌囊肿
  - D. 鼻牙槽囊肿
  - E. 以上都不是
- 93. 临床最常见的颞下颌关节脱位的类型为**
- A. 侧方脱位
  - B. 急性前脱位
  - C. 复发性脱位
  - D. 陈旧性脱位
  - E. 急性后脱位

94. 下述有关颌骨骨髓炎的论述正确的是

- A. 颌周间隙感染导致的中央性颌骨骨髓炎最为常见
- B. 幼儿患者边缘性骨髓炎死骨刮除时切勿损伤牙胚
- C. 急性弥漫性中央性颌骨骨髓炎可导致多数牙松动
- D. 慢性颌骨骨髓炎不适于手术治疗，应以保守为主
- E. 下唇麻木是边缘性颌骨骨髓炎重要的诊断依据

95. 牙周病治疗成功的关键是

- A. 洁刮治
- B. 根面平整
- C. 牙周手术
- D. 组织再生
- E. 菌斑控制

96. 下列关于大疱性类天疱疮的描述中，不正确的是

- A. 是一种慢性自身免疫性的皮肤黏膜疾病
- B. 发病机制主要是形成了抗基底膜带的自身抗体
- C. 形成上皮内疱
- D. 口内常表现为牙龈剥脱
- E. 在外观正常的或有红斑的皮肤上发生张力性大疱

97. 7岁患儿，右下中切牙乳牙滞留，松动Ⅲ度，拔牙时应用

- A. 2%普鲁卡因浸润麻醉
- B. 2%利多卡因浸润麻醉
- C. 2%普鲁卡因阻滞麻醉
- D. 2%利多卡因阻滞麻醉
- E. 2%的卡因表面麻醉

98. 一患者因车祸致口腔颌面部多处裂伤伴下颌骨多发性骨折，出现神志不清，口唇发紫及三凹征时的紧急处理应是

- A. 吸氧
- B. 清创缝合
- C. 骨折复位
- D. 口对口人工呼吸
- E. 气管切开

99. 患者男性，35岁，1周前拔除左下颌第二磨牙，现仍感局部不适，偶有渗血，复诊检查见创口愈合不良，牙龈充血挤压有少量脓性渗出，此时医师一般首先应当对患者进行的治疗为

- A. 医嘱洗必泰液漱口
- B. 局部牙龈切开引流
- C. 彻底搔刮拔牙创
- D. 医嘱口服抗生素
- E. 局部理疗

100. 男性45岁，因右上颌肿物行右上颌骨切除+植皮术，术后所植皮片大部分坏死，遗留较大肉芽创面，准备再行皮肤移植消灭创面，此病例植皮时最好采用

- A. 中厚皮片
- B. 表层皮片
- C. 全厚皮片
- D. 皮瓣

E. 带真皮下血管网的全厚皮片

**三、问答题：（3 题，共 60 分）**

1. 种植牙的定义，优点及注意事项 20 分
2. 试述上颌窦癌的临床表现。20 分
3. 深龋治疗原则是什么？并简述其治疗方法。20 分